



## Kit Piégeage avec phéromone contre la mouche de la Cerise (*Rhagoletis cerasi*)



La mouche de la cerise (*Rhagoletis cerasi*) est un petit diptère présentant un corps noir, une tâche jaune sur le dos et des ailes transparentes avec 4 bandes.

Les dégâts sont causés lorsque la mouche pond ses œufs. Ses œufs donnent lieu à des asticots (larves) qui pénètrent à l'intérieur du fruit où ils s'y développent. La mouche pond un œuf par fruit. Les fruits attaqués pourrissent rapidement (chair molle, brunissement) et finissent par tomber.

Une fois que les asticots ont atteint la fin de leur développement, ils quittent le fruit. Ils passent l'automne et l'hiver dans un cocon enfoui dans le sol ou caché dans les anfractuosités du tronc.

Après l'hiver, les mouches sortent de leurs pupes enfouies au sol et vont s'accoupler. Les œufs sont pondus 10 à 15 jours après les premiers vols dans des cerises qui commencent à mûrir. Ils éclosent 6 à 12 jours plus tard pour donner les asticots qui vont s'alimenter du fruit durant environ 30 jours puis s'enfoncer à quelques cm sous terre et hiverner. Un seul cycle se réalise par an, mais les pupes peuvent subsister dans le sol durant 2 à 3 ans.

Le kit de piégeage permet d'**attirer les mouches mâles**, à l'aide d'une phéromone sexuelle, afin de **stopper la fécondation des mouches femelles donc la reproduction de l'insecte. Cela permet de réduire considérablement le nombre de mouches et de vers les années suivantes.**

**Phéromone sans danger pour l'environnement**

**Protection de 5 semaines**

**Longue durée de conservation : 3 ans au congélateur et 2 ans au réfrigérateur**

**ATTENTION**

**CONSERVER VOTRE PHÉROMONE AU RÉFRIGÉRATEUR OU AU CONGÉLATEUR**

### Informations d'utilisation et conseils

Le piège doit être placé de début avril à fin juillet selon votre variété. On met le piège en place dès que les fleurs se fanent.

Penser à récolter les fruits dès leurs maturités, ramasser ceux tombés au sol, et éviter de planter chèvrefeuilles ou épine-vinettes à proximité du cerisier, car ces plantes sont attractives pour la mouche.

## Mise en place du kit piégeage



Placer la phéromone dans le panier prévu à cet effet **sans toucher la phéromone.**

Clipser le panier à phéromone sur le haut du piège.

Remplir le fond jaune du piège de 250 ml d'eau et deux gouttes d'huile, de liquide vaisselle non-odorant ou du savon noir non-odorant pour empêcher l'eau de s'évaporer et de faciliter la noyade des mouches.

Fermer le piège et le suspendre.


Les mouches mâles attirées par la phéromone sexuelle femelle pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau savonneuse. Vérifiez visuellement s'il reste de l'eau dans le seau sinon en remettre sans toucher à la phéromone.

Fin août, enlever le piège, le nettoyer à l'eau et le conserver pour la saison prochaine où vous devriez mettre une nouvelle dose de phéromone.

**Une dose de phéromone permet 5 semaines de protection il faut 3 phéromones pour couvrir la saison de piégeage**

## Période de mise en place du kit piégeage

Mise en place d'Avril à Août



**ATTENTION**

**CONSERVER VOTRE PHÉROMONE AU RÉFÉRIATEUR OU AU CONGÉLATEUR**